

ENA – 2023 – Gabarito com Soluções

1. A área do triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13 é igual a

- (A) 28.
- (B) 29.
- (C) 30.
- (D) 31.
- (E) 32.

Solução da questão 1

Resposta: C

Como $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$, o triângulo é retângulo.

Portanto, a área é igual a $\frac{5 \cdot 12}{2} = 30$.

2. Numa classe de 50 alunos, 36 foram aprovados. O percentual de alunos **reprovados** nesta classe é

- (A) 14%.
- (B) 28%.
- (C) 36%.
- (D) 50%.
- (E) 72%.

Solução da questão 2

Resposta: B

Foram reprovados $50 - 36 = 14$ e assim a porcentagem de alunos reprovados é dada por $\frac{14}{50} = \frac{28}{100} = 28\%$.

3. O gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = ax + b$, intersecta o eixo horizontal OX no ponto de abscissa

igual a 4 e o eixo vertical OY no ponto de ordenada igual a -12 . O valor de $a + b$ é igual a

- (A) -5 .
- (B) -6 .
- (C) -7 .
- (D) -8 .
- (E) -9 .

Solução da questão 3

Resposta: E

Tem-se que $4 \cdot a + b = 0$ e $0 \cdot a + b = -12$.

Logo $b = -12$ e $a = 3$, portanto $a + b = -9$.

4. Todas as funções abaixo têm como gráficos parábolas cujos vértices estão no primeiro quadrante, **exceto**:

(A) $y = -(x + 1)(2 - x)$

(B) $y = (x + 2)(3 - x)$

(C) $y = -3x^2 + 6x + 7$

(D) $y = 2(x - 1)^2 + 3$

(E) $y = x^2 - 20x + \frac{201}{2}$

Solução da questão 4

Resposta: A

Denotemos por V o vértice da parábola, então segue que os vértices das parábolas são dadas abaixo:

$$y = -(x + 1)(2 - x) = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \implies V = \left(\frac{1}{2}, -\frac{9}{4}\right).$$

$$y = (x + 2)(3 - x) = -x^2 + x + 6 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \implies V = \left(\frac{1}{2}, \frac{25}{4}\right).$$

$$y = -3x^2 + 6x + 7 = -3(x - 1)^2 + 10 \implies V = (1, 10).$$

$$y = 2(x - 1)^2 + 3 \implies V = (1, 3).$$

$$y = x^2 - 20x + \frac{201}{2} = (x - 10)^2 + \frac{1}{2} \implies V = \left(10, \frac{1}{2}\right).$$

Portanto todas as parábolas têm vértice no primeiro quadrante, **exceto** a do item (A).

5. Considere uma progressão geométrica cujo primeiro termo é igual a 4 e a razão é igual a 5.

O menor valor de n para o qual a **soma** dos primeiros n termos da progressão é maior que 2600 é:

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 7.

Solução da questão 5

Resposta: C

A expressão da **soma** dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por $\frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$.

Pelo enunciado, devemos ter $5^n - 1 > 2600$, ou seja, $5^n > 2601$.

Portanto o **menor** valor de n ocorre para $n = 5$, já que $5^5 = 3125$ e $5^4 = 625$.

Solução Alternativa

Os cinco primeiros termos da progressão geométrica são: 4, 20, 100, 500, 2500.

A soma dos quatro primeiros termos é igual a 624.

A soma dos cinco primeiros termos é igual a 3124.

Portanto, o menor índice cuja soma dos n primeiros termos é maior do que 2600 é $n = 5$.

6. Se a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada pela expressão $S_n = 3n^2 + 2n$, pode-se concluir que o décimo termo da progressão aritmética é igual a

- (A) 44.
- (B) 59.
- (C) 65.
- (D) 104.
- (E) 320.


Solução da questão 6

Resposta: B

Se a_n é o n -ésimo termo da progressão aritmética, temos que

$$a_{10} = S_{10} - S_9 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 - (3 \cdot 9^2 + 2 \cdot 9) = 320 - 261 = 59.$$

7. Considere dois quadrados de lados 7 e 3, justapostos como na figura abaixo.



A área do triângulo sombreado é

- (A) 29.
- (B) $\frac{35\sqrt{2}}{2}$.
- (C) $\frac{5\sqrt{109}}{2}$.
- (D) $\frac{67}{2}$.
- (E) $\frac{49}{2}$.

Solução da questão 7

Resposta: E

Completando a figura dada de modo que tenhamos um retângulo de base igual a 10 e altura 7, podemos observar que a área pedida será dada pela área do retângulo acima, subtraindo as áreas dos triângulos retângulos de catetos 10 e 3, 3 e 4, 7 e 7.

$$\text{Portanto a área pedida é igual a } 70 - \left(6 + 15 + \frac{49}{2}\right) = \frac{49}{2}.$$

8. João aumentou para 1,25 a velocidade de exibição de um vídeo de 12 minutos de duração. Ao iniciar a exibição, quanto tempo demorou até o vídeo encerrar?

- (A) 15 minutos.
- (B) 12 minutos.
- (C) 10 minutos e 30 segundos.
- (D) 9 minutos e 36 segundos.
- (E) 9 minutos e 6 segundos.

Solução da questão 8

Resposta: D

As grandezas velocidade de exibição do vídeo e tempo de duração estão relacionadas de tal modo que quanto maior for a velocidade, menor será o tempo de exibição. Além do mais, vejamos que, dobrar, triplicar a velocidade, implica reduzir o tempo de exibição pela metade, terça parte etc. Temos, portanto, duas grandezas inversamente proporcionais.

Deste modo, ajustar a velocidade de exibição em 1,25, ou seja, multiplicar a velocidade por $\frac{5}{4}$, implica dividir o tempo de exibição por $\frac{5}{4}$.

Logo, como $12 \div \frac{5}{4} = 12 \times \frac{4}{5} = 9,6$, após o ajuste de 1,25 na velocidade, o tempo de exibição se reduz para 9 minutos e $\frac{6}{10} \times 60 = 36$ segundos, ou seja, 9 minutos e 36 segundos.

9. Um professor deseja sortear um livro entre os 20 estudantes de uma turma, de acordo com seus respectivos números no diário de classe, de 1 a 20. No momento do sorteio, o professor percebeu a ausência da aluna Sandra, cujo número no diário é o 16. Com essa ausência, combinou com os demais alunos que, se for sorteada a bola com o número 16, haverá um novo sorteio sem essa bola na urna.

Qual é a probabilidade de André, cujo número no diário é 1, ser sorteado?

- (A) $\frac{1}{380}$
- (B) $\frac{1}{20}$
- (C) $\frac{1}{19}$
- (D) $\frac{1}{16}$
- (E) $\frac{1}{10}$

Solução da questão 9

Resposta: C

É indiferente ter ou não a bola com o número 16 na urna. Nesse caso, se essa bola não interessa ao sorteio, André será sorteado com probabilidade igual a $\frac{1}{19}$.

Uma outra forma de resolver o problema sugere considerar duas possibilidades para André ser o ganhador do livro: sair a bola com o número 1 ou a bola com o número 16 na primeira retirada.

O primeiro caso tem probabilidade igual a $\frac{1}{20}$, e o segundo, probabilidade igual a $\frac{1}{20} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{380}$.

Portanto, André ganha o livro com probabilidade igual a $\frac{1}{20} + \frac{1}{380} = \frac{1}{19}$.

10. Os números $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$ formam, nesta ordem, uma progressão aritmética. Sabendo que $x_2 = 8$, a média aritmética entre x_1, x_2 e x_3 é
- (A) 6.
 - (B) 8.
 - (C) 10.
 - (D) 24.
 - (E) impossível determinar.


Solução da questão 10

Resposta: B

Se r é a razão da progressão aritmética, então $x_1 = x_2 - r$ e $x_3 = x_2 + r$.

Logo, a média aritmética de x_1, x_2 e x_3 é igual a $\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = \frac{x_2 - r + x_2 + x_2 + r}{3} = x_2 = 8$.

-
11. O gráfico de frequências acumuladas abaixo mostra a performance de um grupo de 80 estudantes em uma prova final de matemática. As notas são apenas números naturais de 0 a 10.



É correto afirmar que:

- (A) Mais estudantes tiveram nota menor ou igual a 7 do que acima de 7.
- (B) Nenhum estudante tirou a nota 4.
- (C) 10% dos estudantes tiveram nota 10.
- (D) 30% dos estudantes ficaram com a nota abaixo de 5.
- (E) 75% dos estudantes tiveram nota acima de 4.

Solução da questão 11

Resposta: E

Opção (A) é falsa, pois pelo gráfico, menos de 40 alunos tiveram notas inferiores a 7 ou igual a 7, donde mais que 40, ou seja, mais da metade foram acima de 7.

Opção (B) é falsa, que mostra o próprio gráfico.

Opção (C), é falsa, pois temos 10 alunos com notas iguais 10, ou seja, 12,5%.

Opção (D) é falsa, pois foram 20 alunos, ou seja, 25%.

Opção (E) é verdadeira, pois 60 alunos tiveram notas superiores a 4, ou seja, $\frac{60}{80} = \frac{3}{4} = 75\%$.

12. Os possíveis valores de $m \in \mathbb{R}$, para que se tenha $\sin x = \frac{m-1}{m}$ e $\cos x = \frac{m-2}{m}$, para algum $x \in \mathbb{R}$, são:

- (A) 1 e 2.
- (B) 5 e 6.
- (C) 3 e 4.
- (D) 2 e 3.
- (E) 1 e 5.

Solução da questão 12

Resposta: E

Se $\sin x = \frac{m-1}{m}$ e $\cos x = \frac{m-2}{m}$, então $\left(\frac{m-1}{m}\right)^2 + \left(\frac{m-2}{m}\right)^2 = 1$.

Logo $(m-1)^2 + (m-2)^2 = m^2$, ou seja, $m^2 - 6m + 5 = 0$ e assim $m = 1$ ou $m = 5$.

No caso $m = 1$, $\sin x = 0$ e $\cos x = -1$ e no caso $m = 5$, $\sin x = \frac{4}{5}$ e $\cos x = \frac{3}{5}$.

13. O conjunto dos valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para os quais a equação $(\alpha - 2)x^2 + (\alpha - 5)x + 1 = 0$ tem solução única é

- (A) $\{2, 3, 11\}$.
- (B) $\{5, 12, 13\}$.
- (C) $\{2, 6, 13\}$.
- (D) $\{1, 7, 14\}$.
- (E) $\{2, 8, 15\}$.

Solução da questão 13

Resposta: A

Se $\alpha = 2$, obtemos $-3x + 1 = 0$, logo a equação possui solução única.

No caso $\alpha \neq 2$, temos que a equação tem solução única se, e somente se,

$\Delta = (\alpha - 5)^2 - 4(\alpha - 2) = \alpha^2 - 14\alpha + 33 = 0$. Logo $\alpha = 3$ ou 11 . Portanto, $\alpha = 2, 3$ ou 11 .

14. Considere um triângulo retângulo de perímetro 30 e hipotenusa de medida 13. Sendo b e c as medidas dos catetos, o valor absoluto $|b - c|$ é igual a

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

Solução da questão 14

Resposta: D


Como $p = 13 + b + c = 30$ tem-se que $b + c = 17$. Além disso, $b^2 + c^2 = 13^2 = 169$ e assim $b^2 + (17 - b)^2 = 169$.

Assim segue que $2b^2 - 34b + 120 = 0$, ou equivalentemente, $b^2 - 17b + 60 = 0$.

Logo, $b = 12$ ou $b = 5$ e, respectivamente, $c = 5$ ou $c = 12$.

Portanto, $|b - c| = 7$.

15. O paralelogramo $ABCD$ da figura tem área 8, com MA e AB congruentes.



A área do triângulo AHD é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 3,5.
- (E) 4.

Solução da questão 15

Resposta: C

Se a área do paralelogramo é 8, temos que a área do triângulo ABD é igual a 4.

Os triângulos ABD e AHD possuem a mesma altura, logo a área de AHD será multiplicada pela fração $\frac{\overline{DH}}{\overline{DB}}$.

O ponto H é médio de MB e como a medida de DM é a mesma de MB , temos que $\frac{\overline{DH}}{\overline{DB}} = \frac{3}{4}$

Portanto área pedida é igual a $4 \times \frac{3}{4} = 3$.

Solução Alternativa

As diagonais do paralelogramo se cortam ao meio no ponto M , logo determinam quatro triângulos de mesma área.

Como o paralelogramo tem área 8, cada um desses triângulos tem área 2. Como o triângulo ABM é isósceles, a altura AH é mediana, ou seja, H é o ponto médio de BM .

Logo, a área de $AHM = 1$, e a área de $AHD = 1 + 2 = 3$.

16. Em uma urna há 5 bolas azuis e 3 bolas vermelhas e que se diferenciam apenas nas cores. Duas bolas são retiradas, uma de cada vez e sem reposição. Qual a probabilidade de a segunda ser vermelha?

- (A) $\frac{5}{56}$
- (B) $\frac{1}{56}$
- (C) $\frac{3}{8}$
- (D) $\frac{1}{2}$
- (E) $\frac{2}{5}$

Solução da questão 16

Resposta: C

Temos duas possibilidades:

(I) A primeira azul e a segunda vermelha: $\frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$

(II) A primeira vermelha e a segunda vermelha: $\frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$

Logo a resposta é $\frac{15}{56} + \frac{6}{56} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8}$.

Solução Alternativa

Total de possibilidades de retiradas de bolas: $8 \times 7 = 56$.

Para a segunda retirada ser vermelha, teremos para a primeira retirada 7 bolas, ou seja, $7 \times 3 = 21$ possibilidades, já que são 3 bolas vermelhas.

Logo a resposta é $\frac{21}{56} = \frac{3}{8}$.

17. O resultado da divisão x/y , com x e y reais e positivos, triplica quando subtraímos 15 de y e mantemos o valor de x . O valor de y está no intervalo

- (A) $[0, 5)$.
- (B) $[5, 10)$.
- (C) $[10, 20)$.
- (D) $[20, 25)$.
- (E) $[25, +\infty)$.


Solução da questão 17

Resposta: D

Temos que $\frac{x}{y-15} = 3 \cdot \frac{x}{y}$, logo $y = 3(y-15)$ e assim $y = \frac{45}{2} = 22,5$.

Portanto $y \in [20, 25)$.

18. A figura mostra um tabuleiro 4×4 , formado por quadrados pretos ou brancos, que não se altera quando rotacionado de 90° para a esquerda ou para a direita.




Quantos tabuleiros 4×4 , formados por quadrados pretos ou brancos, não se alteram quando rotacionado de 90° para a esquerda ou para a direita?

- (A) 2^2
- (B) 2^4
- (C) 2^6
- (D) 2^8
- (E) 2^{16}

Solução da questão 18

Resposta: B

Observe os quadrados marcados com a, b, c e d na figura abaixo. Ao girar o tabuleiro para a esquerda, o quadrado a cairá sobre o d , o quadrado b cairá sobre o a , o c sobre o b e o d sobre o c . Assim, como o tabuleiro não se altera com essa rotação, d deve ter a mesma cor de a , que deve ter a mesma cor de b e que deve ter a mesma cor de c .



Vamos chamar de A então a cor destes 4 quadrados a, b, c e d . Da mesma forma, há outros 3 grupos de quadrados que caem uns sobre os outros após uma rotação e, portanto, devem ter a mesma cor. Na figura abaixo, denotamos por B, C e D a cor destes quadrados.

A	B	C	A
C	D	D	B
B	D	D	C
A	C	B	A

Assim, para colorir o tabuleiro, precisamos escolher a cor *preta* ou *branca* para cada um destes 4 grupos de quadrados. Como são duas cores possíveis para cada grupo, como são 4 grupos e como as escolhas são independentes, temos então 2^4 possibilidades.


19. Dois postes verticais têm 8 metros e 10 metros de altura, respectivamente, e suas bases, apoiadas em um chão perfeitamente plano e horizontal, distam 20 metros entre si. Se um ponto do segmento que une as bases dos postes está à mesma distância dos topos dos postes, a distância em metros deste ponto à base do poste mais baixo é

- (A) 10,9.
- (B) 10.
- (C) $10 - 2\sqrt{5}$.
- (D) $10 + 2\sqrt{5}$.
- (E) 11.

Solução da questão 19

Resposta: A

Vamos chamar de x a distância entre o ponto e a base do poste de altura 8m, como na figura abaixo. Assim, a distância do ponto à base do poste de altura 10m será dada por $20 - x$. Como as distâncias entre o ponto e os topos dos dois postes são iguais, vamos chamá-las de um mesmo d .



Aplicando o Teorema de Pitágoras aos dois triângulos retângulos da figura, temos

$$d^2 = 8^2 + x^2 \quad \text{e} \quad d^2 = (20 - x)^2 + 10^2.$$

Com isso,

$$8^2 + x^2 = (20 - x)^2 + 10^2,$$

logo

$$64 + x^2 = 400 - 40x + x^2 + 100,$$

e então

$$40x = 436,$$

que nos dá

$$x = \frac{436}{40} = 10,9.$$

Note que é exatamente esta a distância em metros pedida.

20. A diferença entre dois números **positivos** é 2 e o produto é 1. A soma destes dois números é igual a

- (A) 2.
- (B) $2 + 2\sqrt{2}$.
- (C) $2 - 2\sqrt{2}$.
- (D) $2\sqrt{2}$.
- (E) $-2\sqrt{2}$.

Solução da questão 20

Resposta: D

Sejam x e y dois números tais que $x - y = 2$ e $xy = 1$.

Então $y = x - 2$ e assim temos que $x(x - 2) = 1$, ou seja, $x^2 - 2x - 1 = 0$.

Como x deve ser positivo segue que $x = 1 + \sqrt{2}$.

Portanto $y = x - 2 = -1 + \sqrt{2}$ e $x + y = 2\sqrt{2}$.

Solução Alternativa


Sejam x e y dois números reais positivos tais que $x - y = 2$ e $xy = 1$.

Então $x^2 - 2xy + y^2 = 4$ e $4xy = 4$.

Somando, obtemos $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 8$.

Como x e y são positivos, segue que $x + y = 2\sqrt{2}$.

21. Na figura abaixo, dois triângulos retângulos estão justapostos de maneira que os segmentos de medidas a e b destacados são paralelos.




O valor de $\text{sen } \theta$ é igual a

- (A) $\sqrt{\frac{b}{a}}$
- (B) $\frac{b}{a}$
- (C) $a - b$
- (D) $\frac{a}{b}$
- (E) $\sqrt{\frac{a}{b}}$

Solução da questão 21

Resposta: A

Vamos nomear os pontos da figura de acordo com a imagem abaixo:



Temos que $\widehat{ACB} = 90^\circ - \theta$. Como AC e BD são paralelas, temos então $\widehat{CBD} = \widehat{ACB} = 90^\circ - \theta$. Com isso, $\widehat{BCD} = \theta$.

Observando o triângulo retângulo ABC vemos que

$$\text{sen } \theta = \frac{\overline{BC}}{a},$$

logo $\overline{BC} = a \text{ sen } \theta$.

Observando agora o triângulo retângulo BCD vemos que

$$\text{sen } \theta = \frac{b}{\overline{BC}} = \frac{b}{a \text{ sen } \theta},$$

logo

$$\text{sen } \theta = \frac{b}{a \text{ sen } \theta},$$

e então

$$(\text{sen } \theta)^2 = \frac{b}{a},$$

e portanto

$$\text{sen } \theta = \sqrt{\frac{b}{a}}.$$

22. Quantos são os anagramas da palavra **EDITAR** em que as vogais aparecem na ordem alfabética?

- (A) $\frac{6!}{3! 3!}$
- (B) $\frac{6!}{2! 3!}$
- (C) $\frac{6!}{2! 2!}$
- (D) $\frac{6!}{3!}$
- (E) $\frac{6!}{2!}$

Solução da questão 22

Resposta: D

Escolha das posições para as três vogais : $C_6^3 = \frac{6!}{3! 3!}$

Devemos agora multiplicar este resultado pela permutação das outras 3 letras, ou seja, $3!$

Logo a resposta é $\frac{6!}{3!}$.

Solução Alternativa

O total de anagramas da palavra **EDITAR** é $6!$

Desta permutações só queremos aquelas em que as vogais estão em ordem alfabética

Como há $3!$ anagramas das vogais, logo a resposta é $\frac{6!}{3!}$.

23. Se uma esfera de raio r e um cubo de aresta a possuem o mesmo volume, então temos que $\frac{r}{a}$ é igual a

- (A) $\sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}}$
- (B) $\sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}$
- (C) $\sqrt[3]{\frac{4}{3\pi}}$
- (D) $\sqrt[3]{\frac{3\pi}{4}}$
- (E) $\frac{4\pi}{3}$

Solução da questão 23

Resposta: A

Lembre que o volume da esfera de raio r é igual a $\frac{4\pi r^3}{3}$ e o volume do cubo de aresta a é igual a a^3 .

Logo temos que $\frac{4\pi r^3}{3} = a^3$ e assim $\frac{r^3}{a^3} = \frac{3}{4\pi}$, ou seja, $\left(\frac{r}{a}\right)^3 = \frac{3}{4\pi}$.

Portanto $\frac{r}{a} = \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}}$.

24. Se as equações do segundo grau $x^2 - (m + n)x + n - 3 = 0$ e $6x^2 - 2nx + 3m + 2n = 0$ têm as mesmas raízes,

então $m^2 + n^2$ é

- (A) um número par.
- (B) um quadrado perfeito.
- (C) um número primo.
- (D) um cubo perfeito.
- (E) um múltiplo de 4.

Solução da questão 24

Resposta: C

Os coeficientes correspondentes das equações devem estar multiplicados por uma mesma constante, ou seja :

$$\begin{cases} -2n = -6(m + n) \text{ e} \\ 3m + 2n = 6(n - 3) \end{cases}$$

cujo sistema é equivalente a

$$\begin{cases} 3m = -2n \text{ e} \\ 3m + 2n = 6n - 18 \end{cases}$$

concluimos então que $m = -2$ e $n = 3$

Logo $m^2 + n^2 = 13$.

25. Se duplicarmos a aresta de um cubo, o seu volume aumenta

- (A) 100%.
- (B) 200%.
- (C) 400%.
- (D) 700%.
- (E) 800%.


Solução da questão 25

Resposta: D

Ao dobrarmos a aresta de um cubo, o volume ficará multiplicado por $2^3 = 8$

Ou seja, o novo volume será aumentado de 7 vezes, que é equivalente a 700%.

26. Na figura abaixo temos um círculo inscrito em um quadrado de lado ℓ .



Se Q é a área do quadrado e S é a área sombreada, então temos que $\frac{S}{Q}$ é igual a

- (A) π .
- (B) $\frac{\pi}{4}$.
- (C) $\frac{3\pi}{4}$.
- (D) $\frac{4}{4-\pi}$.
- (E) $\frac{4-\pi}{4}$.

Solução da questão 26

Resposta: E

Temos que $Q = \ell^2$ e $S = \ell^2 - \pi \left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \ell^2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$. Portanto $\frac{S}{Q} = 1 - \frac{\pi}{4} = \frac{4-\pi}{4}$.

27. Quantos são os inteiros positivos de 3 dígitos sem o algarismo 7?

- (A) 648
- (B) 729
- (C) 448
- (D) 576
- (E) 512

Solução da questão 27

Resposta: A

Temos que escolher os dígitos dentre 9 algarismos, visto que o 7 não aparecerá. Para o dígito da centena, teremos 8 possibilidades, 9 para o da dezena e 9 para o da unidade.

Pelo princípio multiplicativo a resposta é $8 \times 9 \times 9 = 648$.

28. Se a e b são números inteiros tais que $2a^2 + 5b^2 + 12a - 40b + 98 = 0$, então $a^2 + b^2$ é

- (A) um número primo.
- (B) divisível por 3.
- (C) divisível por 4.
- (D) um cubo perfeito.
- (E) um quadrado perfeito.

Solução da questão 28**Resposta: E**

$$\text{Temos } 2a^2 + 5b^2 + 12a - 40b + 98 = 2(a^2 + 6a + 9) + 5(b^2 - 8b + 16) = 2(a + 3)^2 + 5(b - 4)^2.$$

$$\text{Logo } 2a^2 + 5b^2 + 12a - 40b + 98 = 0 \text{ se, e somente se, } 2(a + 3)^2 + 5(b - 4)^2 = 0.$$

Portanto $a = -3$, $b = 4$ e assim $a^2 + b^2 = 25$ que é um quadrado perfeito.

29. Quantos cubos perfeitos existem entre 101 e 1001?

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 7.
- (D) 8.
- (E) 9.

Solução da questão 29**Resposta: B**

Os cubos perfeitos entre 101 e 1001 são: $5^3 = 125$, $6^3 = 216$, $7^3 = 343$, $8^3 = 512$, $9^3 = 729$ e $10^3 = 1000$.

Portanto há 6 cubos perfeitos entre 101 e 1001.

30. 4 pessoas trabalhando 6 horas por dia, terminam uma tarefa em 5 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias levariam 3 pessoas, trabalhando 8 horas por dia, para fazer a mesma tarefa?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

Solução da questão 30**Resposta: D**

Sejam p , h e d , o total de pessoas, o total de horas trabalhadas por dia e o total de dias trabalhados, respectivamente.

Observe que d é inversamente proporcional a p e inversamente proporcional a h , ou seja, $d = \frac{k}{p \cdot h}$.

Pelo enunciado temos que $5 = \frac{k}{4 \cdot 6}$, assim $k = 120$.

Temos então que $d = \frac{120}{p \cdot h}$.

Para $p = 3$ e $h = 8$, teremos $d = \frac{120}{3 \cdot 8} = 5$.